

INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE OPIOIDES

Sobredosis de opioides Síntomas	Uso y administración de Narcan	Tratamiento asistido por medicación
<ul style="list-style-type: none">• No responde o pierde el conocimiento• Despierto pero incapaz de hablar• La respiración es lenta, superficial, errática o se ha detenido• El tono de piel es azul/púrpura(personas de piel clara) o gris/ceniza(personas de piel oscura)• Sonidos de asfixia o ruido de gorgoteo similar a un ronquido• Vómitos; Cuerpo flácido; Las uñas y los labios son azules o morados-negros• El latido del corazón (pulso) es lento, errático o se ha detenido• Si sospecha de una sobredosis, llame al 911	<ul style="list-style-type: none">• Un medicamento que bloquea los efectos de la sobredosis de opioides en una emergencia• Narcan está disponible para ser comprado en una farmacia sin receta• Muchas agencias tienen fondos para proporcionar Narcan a las personas sin ningún costo• Consulte la Guía de inicio rápido como referencia para usar el Spray Nasal Narcan	<ul style="list-style-type: none">• Los medicamentos más comunes utilizados para tratar la adicción a los opioides son la <i>metadona</i> (alícuída), la <i>buprenorfina</i> (una película colocada debajo de la lengua o una píldora conocida como Suboxone) y la <i>naltrexona</i> (una inyección conocida como Vivitral).• Al tomar <i>metadona</i> o <i>buprenorfina</i>, ¿el individuo se sentirá estable?, ¿no drogado? Y el síndrome de abstinencia no ocurrirá.• La <i>naltrexona</i> ayuda a bloquear los efectos de los medicamentos opioides (la sensación de drogarse) y es una buena ayuda para la prevención de recaídas.• ¡La recuperación es posible!

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre la adicción a los opiáceos y las opciones de tratamiento, llame al:
Línea de ayuda de Illinois 833-2FINDHELP | Línea de ayuda nacional SAMHSA (800) 662-4357